

DESCRIPTION D'UN LAMELLIBRANCHE NOUVEAU DE LA MER ROUGE.

PAR M. Ed. LAMY.

*Crassatella Jousseaumei* nov. sp.

Postérieurement à la publication de ma « Revision des *Crassatellidae* vivants du Muséum d'histoire naturelle de Paris » (1917, *Journ. de Conchyl.*, LXII [1914-1916], pp. 197-470), M. le Dr Jousseaume a bien voulu me remettre pour les collections de ce Muséum cinq exemplaires d'une *Crassatella* recueillie par lui à Djibouti : elle me paraît constituer une espèce nouvelle, pour laquelle je propose le nom de *Crassatella Jousseaumei* et dont voici la description :

*Testa subtrigona, depressa, parum inæqualitalis, carina distincta ex umbone decurrente munita, latere antico rotundato, latere postico in rostrum oblique truncatum breviter producto; margo dorsalis antice arcuatus, postice declivis, non excavatus; margo ventralis ante rostrum distincte emarginatus. Superficies liris concentricis latis undique sculpta, interstitiis fere æqualibus. Umbones acuti, postice incurvati. Lunula utraque elongatæ, lanceolatæ, valde excavatæ. Epidermis tenuis. Color fulvidus, maculis angularibus rubro-brunneis plus minusve confluentibus viride variegatus. Pagina interna aurantio-rufa profuse tincta, versus marginem albicante limbata; margine subtilissime crenulato; impressiones musculares conspicuæ. Cardo normalis.*

*Diam. ant.-post. : 19 millimètres, diam. umbono-ventr. : 15 millimètres, crass. : 7 millimètres* <sup>(1)</sup>.

Coquille subtrigone, comprimée, peu inéquilatérale, munie d'une carène bien marquée descendant du sommet; région antérieure arrondie; région postérieure se prolongeant en un court rostre obliquement tronqué; bord dorsal arqué en avant, déclive et non concave en arrière; bord ventral pourvu d'un sinus très net en avant du rostre. Surface entièrement ornée de côtes larges et saillantes, séparées par des intervalles qui leur sont sensiblement égaux. Sommets aigus, recourbés en arrière. Lunule et corselet

<sup>(1)</sup> Ces dimensions sont celles de trois des exemplaires: il y en a un plus grand (21; 17; 9) et un plus petit (15,5; 12,5; 5).

allongés, lancéolés, profonds. Épiderme mince. Couleur fauve, avec taches anguleuses d'un rouge-brunâtre plus ou moins confluentes en lignes flexueuses. Intérieur des valves roux-orangé, blanchâtre vers le bord qui est très finement crénelé; impressions musculaires bien marquées. Charnière normale comme chez *Cr. contraria* Gmelin.

Cette espèce, qui offre des taches formant des lignes en zigzag et qui est ornée de larges côtes concentriques, aussi bien marquées sur la région postérieure que sur l'antérieure, a une forme intermédiaire entre le *Cr. radiata* Sowerby (1825, *Cat. Shells coll. Tankerville*, Append., p. 11, pl. I, fig. 2; 1843, Reeve, *Conch. Icon.*, I, *Crussatella*, pl. III, fig. 12) et le *Cr. nana* Adams et Reeve (1848, *Zool. Voy. «Samarang»*, *Moll.*, p. 81, pl. XXIII, fig. 2). Tandis qu'ici, dans les stades jeunes, la coquille est nettement transverse, à côté postérieur plus long, elle est, au même âge, orbiculaire et équilatérale chez *Cr. nana*, qui a d'ailleurs des sommets plus obtus et une sculpture devenant obsolète sur la région postérieure; le *Cr. radiata* se distingue, au contraire, par son contour beaucoup plus allongé, avec bord dorsal postérieur concave, et par ses rayons colorés partant du sommet.